

**BASE  
NON-PRINTABLE**

يجب قراءة الملصقة جيداً قبل فتح العبوة  
و استخدام المبيد

رقم التسجيل في العراق: ٢١٣٠

تصنيف منظمة الصحة العالمية: WHO class III  
(طفيف الخطورة)

أميستار علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينجنتا

انتاج: شركة سينجنتا لوقاية المزروعات

بلد المنشأ: فرنسا

في حالة الطوارئ رجاء الإتصال بمركز معلومات السمية  
السويسري /

هاتف: ٠٠٤١٤٤٢٥١٥١٥١ (٢٤ ساعة)

BRAND LOGO/NAME  
Amistar 250 SC®

syngenta®

أميستار ٢٥٠ أس سي®

GROUP 11 FUNGICIDE

مبيد فطري - مركز معلق



Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

200 ml ٢٠٠ مل

يحفظ المبيد بعيداً  
عن متناول الأطفال



خض العبوة جيداً قبل الإستعمال

أميستار مبيد فطري جهازي (عصاري) فعال وقائي وعلاجي  
للسيطرة على مجموعة واسعة من الأمراض الفطرية على  
مجموعة من المحاصيل.

فعال كمعالجة وقائية عند استعماله في المراحل الأولى  
لتطور الفطر.

أميستار يمنع تنفس الفطر. طريقة عمله الفريدة تختلف  
عن المبيدات الفطرية من المجموعات الأخرى، لهذا فهو  
مناسب للتناوب مع تركيبات لها طرق عمل مختلفة.

يحتوي على  
٢٥٠غم/لتر أزوكسي ستروبين azoxystrobin

Batch No/رقم التشغيل  
تاريخ الإنتاج/Manf. date  
تاريخ الانتهاء/Exp date  
انظر الى الختم  
المطبوع على  
الصفحة  
refer to inkjet  
Tracing data is printed on booklet spine  
& PPE number is printed on white back corners with a white back

أميستار مبيد فطري جهاززي (عصاري) فعال وقائي وعلاجي للسيطرة على مجموعة واسعة من الأمراض الفطرية على مجموعة من المحاصيل. في الخضار لغرض السيطرة على المقاومة لآترش أكثر من مرتين خلال الموسم. فعال كمعالجة وقائية عند استعماله في المراحل الأولى لتطور الفطر. وفي الحمضيات ممنوع رش أكثر من رشتين ولا يجب تأخيرها عن نهاية أيار. أميستار يمنع تنفس الفطر.

طريقة عمله الفريدة تختلف عن المبيدات الفطرية من المجموعات الأخرى، لهذا فهو مناسب للتناوب مع تركيبات لها طرق عمل مختلفة.

#### تجهيز محلول الرش

رج القنينة جيدا قبل الأستعمال، اسكب كمية المبيد المطلوبة في دلو ممتليء نصفه بالماء وحرك جيدا حتى يصبح المحلول متجانس. رش أميستار في المراحل الأولى لتطور المرض. رش أميستار بعد الأكتشاف المبكر للفحة يؤدي الى إنتاج ثمار سليمة. معابرة المرش و املا نصف حوض ماكنة الرش بالماء ثم اسكب المحلول و حركه ثم أضف كمية الماء استعمال كمية محلول الرش المناسبة الذي يضمن تغطية كاملة للنبات. في الفترات التي تكون فيها نسبة الأمراض مرتفعة أو سادت أحوال جوية تساعد تطور الأمراض يفضل تقصير المدة بين الرشات.

يجب استخدام المحلول كله في نفس يوم الخلط وان لا يؤجل استخدامه لليوم الذي يلي عملية الخلط. لمنع تطور المناعة يمنع رش اميستار أكثر من رشتين متعاقبتين، يجب استخدام مبيد فطري

غسل آلة الرش

اغسل المرش و جميع أجزائه جيدا قبل و بعد الرش. من المفضل غسله بمحلول غسيل بتركيز ٠.٠٥ % .

تخلص من ماء الغسل في أرض غير زراعية بعيدا عن مصادر المياه و أحواض السمك.

اتلاف العبوات الفارغة

اغسل العبوات الفارغة ثلاث مرات بالماء.

أضف ماء الغسيل الى تنك الرش. اعمل ثقوب في قاع العلبة و جوانبها، اطبقها على بعض ثم ادفنها عميقا في الأرض.

المادة المنسكبة

المادة المنسكبة أو المتسربة يجب امتصاصها بالتراب أو نجارة الخشب ثم يجمع و يؤخذ الى مكان اتلاف المواد الخطرة.

التخزين

خزن المبيد في علبتها الأصلية في مكان جاف و مظلل و مغلق مسموح به لتخزين المواد

ليس سام للنحل

الكيميائية بعيدا عن متناول الأطفال و عديمي الخبرة و الحيوانات، بعيدا عن طعام الإنسان

و الحيوانات.

أبقي المبيد جاف و تأكد من عدم تعرضه للحرارة أثناء التخزين.

الأسعافات الأولية

• في حال ملامسة العيون أو تعرضها لمحلول الرش: تغسل العيون فورا بالماء مع ابقائها مفتوحة تحت الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل ثم راجع الطبيب.

• في حال استنشاق رذاذ الرش: أخرج الشخص المصاب الى الهواء النقي.

• في حال ملامسة الجلد: تنزع الملابس الملوثة مباشرة و تغسل الأجزاء الملوثة من

الجسم بالماء و الصابون.

• في حال الابتلاع: اشرب كأسين من الماء. اطلب الطبيب مع اطلاعه على هذه الملصقة. لا تحاول ادخال أي شيء في فم فاقد الوعي.

خطر على الأسماك و الأحياء المائية.

طريقة الأستعمال: دونم عراقي = ٢٥٠٠ متر<sup>٢</sup>

المحصول	الأصابة	التركيز/كمية الدواء للدونم سم <sup>٣</sup>	كمية المحلول لتر/دونم	آخر موعد للرش قبل الحصاد(يوم)	ملاحظات
حمضيات	لفحة متأخرة	١٢٥	٥٠٠ - ٤٠٠	رشتين فقط وعدم تأخيرها بعد نهاية أيار	
البصل (١)	مرض الأوراق ستمفيليوم و البياض الزغبي	١٢٥	٧٥-٥٠	١٥	المعالجة ضد البياض الزغبي والستمفيليوم يقلل اصابة تيبس ورق البصل
الخيار	البياض الزغبي والبياض الدقيقي	١٢٥	٢٥٠-٢٠٠	٧	
بندوره (١)	بياض دقيق، كلابدسوريوم	١٢٥	٢٠٠-٧٥	١٥	المعالجة ضد اللفحة المتأخرة يقلل الأصابة باللفحة المبكره
فلفل (١)	بياض دقيق	١٢٥	١٥٠-٥٠	١٥	
باذنجان (١)	بياض دقيق	١٢٥	١٥٠-٥٠	١٥	
بطاطاس (١)	اللفحة المتأخرة، الترناريا سولاني	٦٢,٥	٨٨-٥٠	١٥	

THE PENULTIMATE PAGE IS PERMANENTLY AFFIXED TO THE BOTTLE.  
REPEAT LEGAL REQUIREMENTS IF NECESSARY (eg. FRONT PAGE).

IF USING A REPEAT PAGE, PLEASE SWITCH ON VISIBILITY  
OF 'REPEAT PAGE' LAYER IN INDESIGN FILE

المحصول	الأصابة	التركيز/كمية الدواء للدونم سم <sup>٣</sup>	كمية المحلول لتر/دونم	آخر موعد للرش قبل الحصاد(يوم)	ملاحظات
جزر	اللفحة المتأخرة البياض الدقيقي	٦٢,٥ ١٢٥-٦٢,٥ (٢)	٨٨-٥٠	١٥	
حمص	اسكوكايتا	١٢٥	٧٥-٥٠	٦٠	
ثوم (١)	الصدأ ستيمفيليوم	١٢٥ ١٨٨-١٢٥ (٢)	٧٥-٥٠	١٥	ستيمفيليوم: ١٢٥سم/دونم قبل ظهور المرض ١٨٨ سم/دونم بعد أول ظهور للمرض

(١) الخضراوات: يجب أن تكون الفترة بين الرسة و الأخرى من ٧-١٠ أيام. معالجتين فترة الأمان لدخول الحقل المرشوش: لا تدخل الحقل المرشوش (حقل مكشوف و بيوت اثنتين فقط، رش قبل ظهور المرض أو في المراحل الأولى لتطور المرض. بلاستيكية) الا بعد أربع ساعات من وقت الرش.

(٢) بناء على خطورة المرض.

تحذير: ممنوع رش أميستا لا بعد ٢١ يوم من زراعة الأشتال أو ٣٥ يوم من زراعة البذور. أميستا فعال جدا ضد أمراض التربة عند اضافته عن طريق التربة (تجريع).

ملاحظة: دونم عراقي = ٢٥٠٠ متر<sup>٢</sup>

المحصول	الأصابة	معدل الإستخدام
بطاطا	ريزكتونيا*	٥٠٠سم ٣ / دونم حقن عن طريق التربة عند الزراعة

\* في المراحل الأولى أو قبل ظهور المرض

تحذيرات

- أميستار يمكن أن يسبب حساسية للعينين و الجلد.
- ارتداء كفوف جلد و البسة واقية و نظارات واقية أثناء العمل.
- عدم التعرض أو استنشاق رذاذ الرش.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد.
- لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء العمل.
- غسل الجلد جيدا بالماء و الصابون عند تعرضه للمبيد و يجب نزع الألبسة في حال تلوثها وغسلها مباشرة.

في حالة الطوارئ رجاء الإتصال بمركز معلومات السمية السويسري /

هاتف: ٠٠٤١٤٤٢٥١٥١٥١ (٢٤ ساعة)

أميستار علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينجنتا

إنتاج: شركة سينجنتا لوقاية المزروعات

© حقوق الطبع محفوظة لشركة سينجنتا لوقاية المزروعات ٢٠١٣

THESE PAGES CAN BE ADDED OR REMOVED AS NECESSARY  
TO CREATE A 4, 8, 12, OR 16 PAGE BOOKLET  
(INCLUDING GLUE PAGE)

TEXT AREA  
136 x 54 mm

THE PENULTIMATE PAGE IS PERMANENTLY AFFIXED TO THE BOTTLE,  
REPEAT LEGAL REQUIREMENTS IF NECESSARY (eg. FRONT PAGE)

**IF USING A REPEAT PAGE, PLEASE SWITCH ON VISIBILITY  
OF 'REPEAT PAGE' LAYER IN INDESIGN FILE**

GLUE PAGE