

L1130079 SAUD/12C - PPE 4222598

عند المشاشق: ينقل المصاب إلى الهواء الطلق بعيداً عن مكان التلوث
عند ملامسة الجلد: يجب خلع الألبسة الملوثة وغسل الجلد جيداً بالماء والصابون
عند ملامسة العين: الغسل بالماء النظيف لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة ومراجعة الطبيب إذا لم يخف الألم
للطوارئ الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٢٧)

مضاد للتسمم: لا يوجد مضاد معين معروف ويكون العلاج حسب الأعراض الظاهرة. يجب أخذ نشوة
الفييد مع المصاب إلى الطبيب.

BRAND LOGO/NAME

LOGO/NAME
LOGO/NAME

- احتياطات:
- 1- تجنب التعديلات العدمية على جملطة المطوهرات جيدة.
 - 2- لبس الملابس الواقية (مئزر-حذاء-قبعة- قفازات- أقمعة) عند خلط المبيد.
 - 3- عدم الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الريح أو أثناء توقع هطول الأمطار.
 - 4- تجنب استنشاق بخيرة المبيد.
 - 5- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.
 - 6- لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استعمال المبيد.
 - 7- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد بالطرق العلمية الصحيحة.
 - 8- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد الاستعمال.
 - 9- غسل آلات الرش بالماء بعد الاستخدام.

تلافى العيوب الفارقة: يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم ثقب العبوات المعدنية والبلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك

الضمان:

تضمن الشركة المبيد في عبوته الأصلية وتحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرار ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

52

استيراد: شركة صروح الزراعية
تلفون: ٠٠٦٦٦١١٤٦٠١٠٤٥ - فاكس: ٠٠٦٦٦١١٤٦٠١٢٢٨
١١٣٣٣ الرياض ص ب ٧٤٥

الشركة المنتجة: سنغنتا
البلد المنتج: بريطانيا

Refer to inkjet printed
انظر إلى الختم
المطبوع على العبوة.
سنتان من تاريخ الإنتاج.

رقم الدفعة / Batch No.:
تاريخ الصنع/Man. Date:
تاريخ إنتهاء الصلاحية/Expiry Date:

التواضع:
إيستار جولد ميد فطري جهازى على هيئة مركز معلق (SC) يقضي على مجموعة واسعة من
المفروبات التي تصيب محصول القمح.

الاستعمال:

المحصول	المرض	معدل الاستخدام للهكتار	فترة التحريم
القمح	البياض الدقيقي، الأصداء، السبوتوريا وأفراض تعفن	٧٥٠ مل/هكتار بمعدل رشتين، الأولى عند نهاية التفرع حتى العقدة الثانية، الرشة الثانية عند تكون تطور ورقة العلم.	٣٠ يوم
الساق			

ملاحظات:

يمكن استخدامه قبل أو عند بداية ظهور الإصابة.
يجب تغطية جميع أجزاء النبات عند الرش.
يجب الوقوف عن الرش عند جني المحصول مع مراعاة فترة التحريم المحددة على الملصق.
يمكن استخدام المبيد في برنامج مكافحة المتكاملة IPM.

فترة إعادة الدخول للحقل للعلاج: منع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ٦ ساعات إلا
في حالات الضرورة تقصيم للفنيين المتخصصين ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر، حذاء، قبعة،
قفازات، أقمعة) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والترتبة)

القابلية للخطر:

إيستار جولد قابل للخط مع العديد من المبيدات ولكن قبل الخلط يرجى الاتصال بالوكيل لإعطاء مزيد
من المعلومات أو عمل خلطة تجريبية صغيرة قبل الرش على المساحات الكبيرة.

التخزين:

يخزن في عبواته الأصلية في مكان آمن وجاف بعيداً عن البذور والأسمدة والمواد الكيماوية وبعيداً عن
مصادر الحرارة والرطوبة وأضعة الشمس المباشرة
تنبيه: يجب اتباع تعليمات الاستعمال والتخزين بدقة وان الشركة المنتجة والموزع غير مسئولين عن
نتائج سوء الاستعمال والتخزين.

الأثر على الإنسان والحيوان والبيئة:

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع واستنشق أو لامس العين أو الجلد، سام للأسماك
والأحياء المائية كما ان المبيد متوسط السمية على النحل ويجب عدم تلويث مصادر
المياه بالمبيد.

الإسعافات الأولية:

عند بلع المبيد : لا ييجر المصاب على التقيؤ ويستعدى الطبيب



syngenta®

Product names marked ® or ™ are the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

أبعد المبيد عن متناول الأطفال



⚠
ضار
Harmful



S-PAC

DESCRIPTION:
LBL S PANEL L H 130X140 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN003

ISSUE DATE:
30.07.2009

256207

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plaît avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.