

**BASE
NON-PRINTABLE**

مضاد التسمم:

غير معروف مضاد التسمم ويتم العلاج حسب الأعراض الظاهرية.

شروط التخزين:

يحفظ المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف بعيدا عن تناول الاطفال والأغذية والأعلاف والأسمدة والبذور وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة وبعيدا عن الرطوبة في مكان جيد التهوية.

تنبيه:

يجب اتباع تعليمات الاستخدام والتخزين بدقة و أن الشركة المنتجة والموزعة غير مسؤولين عن نتائج سوء الاستخدام والتخزين.

الإستيراد و التوزيع: شركة الجبالي الزراعية - الأردن

® علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينجنتا

رقم التسجيل في الأردن: ٣٣٥٣



syngenta®

مبيد زراعي سام

دوريفو®
٣٠٠ اس سي

مبيد حشري جهازي واسع الطيف على هيئة مركز معلق يستعمل لسقاية المزروعات



Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

250 ml

٢٥٠ مل

تحذير: احفظ المادة بعيداً عن تناول الأطفال وغير المخولين والحيوانات

دوريفو مبيد حشري يستخدم عن طريق السقاية و يعمل باللامسة وكسم معوي.

يستخدم سقاية في بداية الموسم لمرة واحدة فقط.

يحتوي المبيد على:

١٠٠ غرام/ لتر من كلورانترانيليبيرول + ٢٠٠ غرام/ لتر من ثياميثوكسام.

100g/L Chlorantraniliprole + 200g/L Thiamethoxam

GROUP 4A 28 INSECTICIDES

إنتاج: شركة سينجنتا لوقاية المزروعات
بلد المنشأ: المجر

في حالة الطوارئ رجاء الإتصال بمركز معلومات السمية السويسري / هاتف: ٠٠٤١٤٤٢٥١٥١٥١ (٢٤ ساعة).

رقم التشغيل/ Batch No:
 تاريخ الإنتاج/ Manf. date:
 تاريخ الانتهاء/ Exp date:
 refer to the label for more information

الخواص:

- دوريفو مييد حشري يستخدم عن طريق السقاية و يعمل بالملامسة وكسم معوي.
- المادة الفعالة كلورانترانيلبيرول من مجموعة كيميائية جديدة تسمى أنثرانيلاميد والتي تعمل على تحفيز الخلايا العصبية داخل اليرقة على افراز كمية كبيرة من الكالسيوم وبالتالي تصبح اليرقة غير قادرة على هضم الطعام وذلك يؤدي الى شللها وموتها.
- المادة الفعالة ثياميثوكسام لها تأثير واسع الطيف تستخدم لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة وبعض الحشرات القارضة في العديد من المحاصيل. تتميز المادة الفعالة بخاصية الجهازية في كل من الاوراق، والساق. تؤثر المادة الفعالة على مستقبلات الأستيل كولين في الجهاز العصبي.

القابلية للخلط:

دوريفو مييد يستعمل عن طريق السقاية و قابل للخلط مع معظم المبيدات المعدة للسقاية ولكن قبل الخلط يرجى عمل خلطة تجريبية صغيرة قبل المعاملة الكبيرة للتأكد من التوافق.

الإسعافات الأولية:

- في حالة الإصابة يجب إبعاد المصاب عن مصدر التعرض للمبيد وإستدعاء الطبيب فوراً.
- عند البلع: يعطى المصاب الفحم الطبي مع كمية وافرة من الماء بشكل متكرر، لا يعطى المصاب أية سوائل عن طريق الفم ولايجبر على التقيؤ إذا كان فاقد الوعي.
- عند الأستنشاق: وضع المصاب في الهواء الطلق ويجري له تنفس اصطناعي اذا كان لا يستطيع التنفس.
- عند ملامسة الجلد: تنزع الملابس الملوثة ويغسل الجلد جيداً بالماء والصابون.

عند ملامسة العين: الغسيل بالماء النظيف بكثرة (١٠-١٥ دقيقة)

أعراض التسمم: غير معروفة، إذا شعرت بأي أعراض مثل الدوخة أو الصداع فيجب الذهاب إلى الطبيب فوراً.



- المخادير:
- يسبب حساسية للعيون.
- قد يسبب حساسية للجهاز التنفسي.
- سام جداً للنحل.
- سام جداً للأحياء المائية.
- قد يكون مسرطن.
- قد يسبب ضرر للأعضاء نتيجة التعرض المتكرر أو لفترات طويلة.

احتياطات:

- 1- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة.
- 2- لبس الملابس الواقية (مئزر، حذاء، قفازات، اقنعة) عند خلط أو استعمال المبيد.
- 3- تجنب استنشاق ابخرة او غبار المبيد.
- 4- تجنب ملامسة المبيد للجلد او العين او الفم.
- 5- لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استعمال المبيد.
- 6- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد الاستعمال.
- 7- غسل الألات المستعملة بالماء بعد الاستخدام.

معدلات وطرق الاستخدام:

المحصول	الحشرات	معدل الاستعمال (سقاية)	عدد مرات الرش	الفترة ما بين الرش والآخرى	فترة التحريم
اشتال الخضروات: بندوره، فلفل، باذنجان، خيار، كوسا، بطيخ، بامبا، ذرة حلوة، بازلياء، فاصوليا، جزر، بصل، ثوم	دودة القطن، الدودة القارضة السوداء، دودة ثمار البطاطا، حفار اوراق، البندورة، الديدان القارضة الخضراء، تريس البصل و الازهار، الذبابة البيضاء، صانعات الانفاق	٦٠٠ مل لكل هكتار او ٦٠ مل لكل ١٠٠-١٥٠ لتر ماء لمعاملة ١ دونم	٢	٣٠ يوم	٣٠ يوم
اشتال العائلة الصليبية: ملفوف، زهرة، بروكلي	عثة الظهر الماسي، الدودة القارضة السوداء، الدودة الخضراء، دودة الملفوف الكبيرة و الصغيرة، من الملفوف، تريس البصل و تريس الازهار، الذبابة البيضاء	٦٠٠ مل لكل هكتار او ٦٠ مل لكل ١٠٠-١٥٠ لتر ماء لمعاملة ١ دونم	٢	٢٥ يوم	٣٠ يوم
اشتال الورقيات: خس و سبانخ	عثة الظهر الماسي، الدودة القارضة السوداء، الدودة الخضراء، دودة الملفوف الكبيرة و الصغيرة، من الملفوف، تريس البصل و تريس الازهار، الذبابة البيضاء	٦٠٠ مل لكل هكتار او ٦٠ مل لكل ١٠٠-١٥٠ لتر ماء لمعاملة ١ دونم	١	--	٣٠ يوم

تحذير تجنب استخدام المبيد لغير المحاصيل المذكورة مع الالتزام بفترات ما قبل الحصاد (PHI) أثناء عملية القطف

لتجنب حدوث المتاعب، يجب استخدام مبيد دوريفو مع مبيدات ذات طرق عمل مختلفة.

- مبيد دوريفو ينتمي الى المجموعة الكيميائية رقم ٢٨ و المجموعة 4A حسب تصنيف IRAC ولذلك يجب ان لا تتجاوز عدد المعاملات اكثر من ٥٠٪ مع مبيدات من نفس المجموعة.

يجب التأكد من ان اداة الاضافة معايرة بشكل صحيح لضمان توزيع متساوي للمحلول في الحقل المعامل.

ملاحظات:

- يجب اضافة ٥٠ مل من محلول السقاية لكل شتلة ، يستخدم مرة واحدة خلال الموسم (عند الزراعة أو مرحلة الشتيل،
يستخدم عن طريق السقاية فقط).

- يجب اضافة المبيد عند الحد الاقتصادي الحرج لتواجد الحشرات.

GLUE PAGE