

**BASE
NON-PRINTABLE**

LT119324 JORD/05C PPE 4207952

المميزات:

ريڤوس مركز معلق أول مبيد فطري من عائلة المونديلاميد الجديدة.

تصنيف منظمة الصحة العالمية:

WHO class III (قليل الخطورة)

المحاذير:

- سام جداً للأحياء المائية.



يجب قراءة الملصقة جيداً قبل فتح العبوة و استخدام المبيد.

® علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينجنتا

انتاج: شركة سينجنتا لوقاية المزروعات /بازل، سويسرا

بلد المنشأ: فرنسا

رقم التسجيل بالأردن: ٢٥٠٣

BRAND LOGO/NAME
Revus 250 SC
FUNGICIDE

syngenta®

مبيد زراعي سام

ريڤوس® ٢٥٠ مركز معلق

مبيد فطري قابل للامتصاص من الجيل الجديد لمكافحة البياض

الزغبى و اللفة المتأخرة على الخضراوات و البطاطا



Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

250 ml

٢٥٠ مل

تحذير: احفظ المادة بعيداً
عن متناول الأطفال



يحتوي على ٢٥٠ غرام في اللتر من المانديپروباميد على شكل مركز معلق.

250 gr. /Lt Mandipropamid

GROUP 40 FUNGICIDE

شروط التخزين:

يخزن بعيداً عن الشمس والرطوبة ، ويخزن المبيد بالعبوات الأصلية جيدة الإغلاق في مكان آمن وجيد التهوية بعيداً عن الطعام. تجنب التخزين في درجة حرارة اعلى من ٣٥ درجة مئوية.

الوكيل بالأردن: شركة الاتحاد الزراعي الاردني المحدودة المسؤولة ص.ب ٦٠٥ عمان - ١١١١٨ الاردن

هاتف: ٥٨٥٦٤٣٣ (الإدارة)

فرع السوق المركزي: هاتف: ٤١٢٠٣٥٧

فرع الغور: لواء دير علا - مثلث العارضة - مجمع عبد الغفور باكستاني

في حالة الطوارئ رجاء الإتصال بمركز معلومات السمية السويسري / هاتف: ٠٠٤١٤٤٢٥١٥١٥١ (٢٤ ساعة).

رقم التشغيل / Batch No
تاريخ الإنتاج / Manf. date
تاريخ الانتهاء / Exp date
نظراً إلى الختم
الطبوع على
الزوايا مع خلفية بيضاء

LT119324 JORD/05C PPE 4207952

20mm BOOKLET SPINE SHOULD BE KEPT VARNISH FREE

تعليمات الاستعمال:

المحصول	الأفات	معدل الإستخدام	طريقة المكافحة	فترة الأمان
البطاطا	اللفحة المتأخرة	٤٠-٥٠ مل في ١٠٠ لتر ماء اي ما يعادل ٠,٤ - ٠,٥ لتر في الهكتار	رش ورقي، ٧٠ أيام بين الرش و الرش على الا تزيد عن ٦ رشات في الموسم الواحد	٣ أيام
البندورة	اللفحة المتأخرة	٤٠-٥٠ مل في ١٠٠ لتر ماء اي ما يعادل ٠,٤ - ٠,٥ لتر في الهكتار	رش ورقي، ٧٠ أيام بين الرش و الرش على الا تزيد عن ٤ رشات في الموسم الواحد	٣ أيام
البطيخ الشمام	البياض الزغبي	٤٠-٥٠ مل في ١٠٠ لتر ماء اي ما يعادل ٠,٤ - ٠,٥ لتر في الهكتار	رش ورقي، ٧٠ أيام بين الرش و الرش على الا تزيد عن ٤ رشات في الموسم الواحد	٣ أيام
الخس	البياض الزغبي	٤٠-٥٠ مل في ١٠٠ لتر ماء اي ما يعادل ٠,٤ - ٠,٥ لتر في الهكتار	رش ورقي، ٧٠ أيام بين الرش و الرش على الا تزيد عن ٢ رشتين في الموسم الواحد	٧ أيام

تحذير: تجنب استعمال المبيد على غير المحاصيل الواردة في الجدول مع الالتزام بفترات الامان أثناء عملية القطف

قابلية الخلط: تقع على عاتق المستخدم مسؤولية التأكد من ان جميع المنتجات المراد خلطها مسجلة للاستخدام المطلوب.

يجب قراءة و اتباع جميع التعليمات و القيود على جميع ملصقات المنتجات المراد خلطها في تلك الرش و اتباع التعليمات الأكثر تقييداً. و يُفضل اجراء تجربة خلط مبدئية قبل الاستعمال ب ٢٤ ساعة..

فترة تحريم دخول الحقل بعد المعاملة: ٨ ساعات

ثبات المبيد:

المبيد ثابت لعدة ايام على الرقم الهيدروجيني (pH) ٩-٥ و درجة حرارة ٢٥ متوي مع استمرار عملية التحريك للمحلول. و يجب عدم تركه طوال الليل في خزان الرش. يجب استخدام محلول الرش خلال عدة ساعات من تحضيره. التسرب والتناثر:

عند التناثر، تخلص من الطبقات المتناثرة بدفنها في مكان أمين بعيداً عن مصادر المياه. عند التسرب اخلط المبيد المتسرب بالتراب أو بالبودرة ثم اجمعها واطمرها في مكان أمين، أو صعبها في أكياس بلاستيكية مشر عليها وتخلص منها في أرض غير مزروعة، عالج المناطق المتسرب إليها المبيد بوفرة من المياه. المبيد المتسرب يجب ألا يعاد استعماله.

التخلص من فائض المبيد:

تخلص من فائض مركز المادة في أرض بور غير زراعية بحفرة أو بدفنه في مكان أمين بعيداً عن مصادر المياه وبعد تمديده. اغسل العبوات الفارغة بالماء وأضف محلول الغسيل إلى خزان الرش، ثقب العبوات المعدنية الفارغة وتخلص منها في أرض بور غير مزروعة بدفنها في مكان أمين بعيداً عن مصادر المياه. لا تستخدم العبوات الفارغة لأي غرض آخر وخصوصاً للطعام والشراب أو العلف.

شروط التخزين:

أخزن بعيداً عن الشمس والرطوبة وفي العبوات الأصلية المحكمة الإغلاق وفي منطقة جيدة التهوية. تجنب الخزن في درجة حرارة لا تزيد على درجة ٣٥ مئوية.

طريقة العمل

ريفوس مركز معلق ذو فاعلية كبيرة ضد الأمراض التي تنتمي إلى قسم الأوميسات وتحديدًا البياض الزغبي و اللفحة المتأخرة.

عند القيام بالمكافحة، جزء كبير من المادة الفعالة يثبت في الطبقة الشمعية لسطح النبات مما يجعل المادة الفعالة مقاومة للغسل بصفة كلية مباشرة عند جفاف خليط الرش.

يتميز الماندنيروبياميد بفاعلية كبيرة ضد نمو الأبواغ وكذلك الهيفات في فترة الحضانة. ريفوس يمتلك قدرة على اختراق النبات و يؤدي إلى حماية شاملة لكنلى سطحي الورقة.

حساسية الزراعة للمبيد: ليس لريفوس مركز معلق

تأثيرات سلبية على الزراعات عند استعماله حسب التوصيات.

المكافحة المتكاملة

ريفوس مركز معلق غير سام للنحل والحشرات النافعة لذلك يمكن إدراجه ضمن برامج مكافحة المتكاملة .

التعامل مع الأصناف المقاومة:

تفادياً لظهور أصناف مقاومة، يجب استعمال ريفوس مركز معلق بالتناوب، في إطار برنامج مكافحة يحتوي على مبيدات أخرى ذات طريقة فاعلية مختلفة.

كيفية الاستعمال

تعديل معدات الرش

يجب معايرة معدات الرش بطريقة جيدة حتى يوزع الخليط بطريقة متجانسة.

خليط الرش

استعمل كمية ماء لا تقل عن ٢٠٠ لتر في الهكتار لتغطية كافة الجهاز الخطري للبطاطا وذلك قصد الحصول على التصاق و امتصاص جيد للمبيد.

تحضير الخليط

املاً الخزان حتى الربع بماء نظيف، ابدأ بالخلط، ضع كمية المبيد اللازمة ثم أضف كمية الماء المتبقية، واستمر بالتحريك أثناء القيام بالرش للحفاظ على

تجانس الخليط.

تنظيف معدات الرش: بعد الاستعمال، اغسل جيداً معدات الرش بالماء.

تدابير السلامة

- احتياطات الاستعمال: يجب حفظ المبيد بعيداً عن متناول الأطفال و بعيداً عن المأكولات والمشروبات بما في ذلك علف الحيوانات. يجب عدم الأكل والشرب و التدخين أثناء استعمال المبيد .

الإسعافات الأولية :

- عند الشك بالتعرض للتسمم، أوقف العمل فوراً وأستدع الطبيب .

- عند ملامسة المادة للجلد: انزع الثياب الملوثة واغسل الأجزاء من الجسم الملوثة بوفرة من الماء والصابون .

- عند وصول رذاذ الرش للعينين: اغسل العينين بوفرة من الماء النظيف لمدة ١٥ دقيقة .

- عند استنشاق رذاذ الرش، ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية .

- عند ابتلاع المادة: يعطى المصاب كمية قليلة من الفحم الطبي والماء، وفي

حالة ابتلاع كمية كبيرة من مركز المبيد، ينقل للمستشفى. يحظر إعطاء أي شيء عن طريق الفم للمصاب فاقد الوعي.

مضاد التسمم: لا يوجد مضاد تسمم معين، يعالج حسب الاعراض الظاهرة.

عوامل الأمان/التدابير الوقائية/ سلامة مستخدم المادة :

تجنب ملامسة المبيد للجلد، العينين والثياب. لا تستنشق رذاذ أو بخار الرش. لا تاكل أو تشرب أو تدخن أثناء العمل واغسل اليدين والوجه قبل الطعام، الشراب أو التدخين،

عند الشعور بالإصابة أوقف العمل فوراً اتبع تدابير الإسعاف الأولي واستدع الطبيب. ارتد ملابس واقية (أوفرول) وقبعة وحذاء مطاطي متين وقفازات. اغسل كامل الجسم بوفرة من الماء بعد كل استعمال واغسل ثياب العمل وأجهزة الرش قبل إعادة استعمالها.

مسؤولية المستخدم: يتحمل المستخدم مسؤولية كل الأخطار الناجمة عن سوء الاستعمال او التخزين و الخارجية عن إرادة المُنتج. بما أنه لا يمكن التنبؤ بتشكيل سلالات مقاومة للمبيد، لا تتحمل الشركة المنتجة أي مسؤولية عن الحوادث والأضرار التي تلحق بالمحاصيل المعاملة بالمنتج نتيجة تشكل الأمراض التي قد تكون مقاومة للمبيد.

الضمان:

تضمن الشركة المنتجة جودة المنتج للأغراض الموصى بها شريطة أن يقدم للمستخدم في عبوته الأصلية، و الالتزام بالتوصيات المذكورة على ملصق العبوة.

© حقوق الطبع محفوظة لشركة سينجنتا لوقاية المزروعات

GLUE PAGE